

2013年6月改訂

黄快顆粒

第2類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬(下剤)

2.授乳中のは本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



1.次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人.
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人.
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人).
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人.

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4.1週間位(便秘に頓服用として用いる場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり

【用法・用量】成人(15才以上)1回 1包 7才以上15才未満1回 2/3包

4才以上7才未満1回 1/2包 4才未満 服用しないこと

いずれも1日1回水又は白湯で頓用する。

<用法及び用量に関する注意>

4才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】1日量1包(1包 1.5g)中 センキュウ末 1.0g ・ ダイオウ末 0.5g

【保管及び取り扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

2.小児の手の届かない所に保管すること。

3.他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 北日本製薬株式会社 富山県中新川郡上市町若杉55

問い合わせ先 076-472-1011

D

内容量 400包