

2013年6月改訂

黄快錠

第2類医薬品



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1週間位(便秘に頓服用として用いる場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり

【用法・用量】

成人(15才以上) 4錠を1日1回頓用する
15才未満 服用しないこと

【成 分・分 量】 1日量4錠(1錠480mg)中

ダイオウ末 500mg ・ センキュウ末 1,000mg

添加物:乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、タルク、
ステアリン酸Mg含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
2. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること
3. 小児の手の届かないところに保管すること。
4. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わる)

内容量 1,000錠

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 ホニタ日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55
問い合わせ先076-472-1011