

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

ピーチラック錠 540錠

【漢方薬】

第2類医薬品

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 高齢者 (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (7) 次の症状のある人: むくみ (8) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	症状の名称	症状
		間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、げばしい腹痛を伴う下痢、腹痛	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
		肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疽(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位(きれ痔、便秘)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 体中中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症:痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数	5歳未満は服用しないでください
成人(15歳以上)	6錠	3回	
15歳未満7歳以上	4錠		
7歳未満5歳以上	3錠		

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中

(オウゴン1.5g・カンゾウ1.0g・サイコ2.5g・ショウマ0.75g・ダイオウ0.5g・トウキ3.0g)乙字湯エキス(1/2量)1,300g 添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 袋の中に乾燥剤を入れています。誤って服用しないよう注意してください。
- (5) 使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

販売元

株式会社ハーバルアイ

福岡県福岡市中央区天神5丁目7-3 福岡天神北ビル6階

問い合わせ先

漢方生薬研究所お客様相談室

0120-852-489(受付時間:平日10:00~17:00)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社 和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度の間合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)