

この説明文書は服用前に必ずお読みください
また、必要な時に読めるように保管してください

第2類医薬品

痔疾内服治療剤 モリチーネン

モリチーネンは、腸を整え、血行を改善し、消炎・鎮痛・止血作用のある6種の生薬からなる乙字湯乾燥エキスを主薬に、薬用炭を加味した“のむ痔のくすり”です。



使用上の注意

(本剤は内服痔疾用薬として定められた一般的な注意事項を記載しています)

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)高齢者。
 - (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人、むくみ
 - (8)次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
周 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 4.1ヵ月位(きれ痔、便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以上で、大便秘結、便秘傾向のあるものの次の諸症：

痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

用法・用量

年齢	成人(15才以上)	7才以上15才未満	7才未満
1回量	5錠	3錠	服用しないこと

1日3回食前または食後に服用してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤のPTPシート製品の場合、右図のように、錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量 本品15錠(1日量)中

乙字湯乾燥エキス …………… 1200mg

〔トウキ 5.0g・サイコ 4.0g・オウゴン 3.0g〕
〔カンゾウ 3.0g・ショウマ 1.5g・ダイオウ 1.0g〕より抽出

添加物：薬用炭(コーティング剤)

乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ヒプロメロース、ゼラチン、アラビアゴム、白糖、カルナウバロウ、赤色3号、青色2号、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)本剤は黒色の糖衣錠のため、手でふれたり湿ったりしますと艶がなくなったり白くなることがあります。

痔の養生訓

痔は、肛門部のうっ血から始まります。肛門部の血管は普通の静脈と異なり弁を持たないため、ちょっとした刺激で血液が溜まりやすくうっ血します。

したがって ①水分を多くとる ②楽な姿勢で便通を心がける。いきみは禁物です ③いつも清潔に ④患部は温めて血行をよくする ⑤刺激物(香辛料、アルコールなど)はひかえる

これらが痔のなおりを早くいたします。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は下記にお願いいたします。

日邦薬品工業株式会社・お客様相談室

「電話：03-3370-7174(代表)」

受付時間…9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 福井製薬株式会社

大阪市城東区今福東3丁目1番26号