

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。むくみ(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオギー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(急性胃腸炎、下痢に服用する場合には5~6回、感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法・用量】成人(15才以上)1回1本、1日3回食前又は食間に服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 食間とは食後2~3時間を指します。
- (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【成分・分量】1日量(3本(90mL))中

藿香正気散料エキス…12.5g	
日局ビャクジュツ… 3.0g	日局ハンゲ… 3.0g
日局クリョウ… 3.0g	日局コウボク… 2.0g
日局チンピ… 2.0g	日局タイソウ… 2.0g
日局キョウ… 1.5g	日局カクコウ… 1.0g
ダイフヒ… 1.0g	日局ビャクシ… 1.0g
日局カンソウ… 1.0g	日局ショウキョウ… 1.0g
日局ソウヨウ… 1.0g	

に相当

添加物：白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、パラベン、安息香酸Na、香料

【効能・効果】体力中等度以下のものの次の諸症：感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045(593)2136