

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 漢方製剤

第2類医薬品

# 葛根湯エキス「顆粒」S

葛根湯エキス「顆粒」Sは、漢方処方である「葛根湯」から抽出したエキスを服用しやすい顆粒状に製した漢方薬です。「葛根湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「金匱要略」、「傷寒論」に収載されている漢方薬で、かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こりに用いられます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

#### 3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

## 【用法・用量】

次の量を、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】


1日量(3包4.5g)中

葛根湯エキス(1/2量)	2.0g	マオウ	1.5g
「カッコン」	2.0g	タイソウ	1.5g
「ショウキョウ」	0.5g	ケイヒ	1.0g
「ケイヒ」	1.0g	「シャクヤク」	1.0g
「カンゾウ」	1.0g	より製したエキス	

添加物として、乳糖水和物、無水ケイ酸、サリチル酸、香料を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。



- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。

- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)