

登録品目番号24-501

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス 8300mg

(カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、) より製した
シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g エキス
添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、
グリセリン、I-メントール、プロピレングリコール、バニリン、香料を
含有する。

【効能・効果】かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本(30mL)、1日3回食間
によく振ってから服用してください。

【用法・用量に関連する注意】(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)成人(15歳以上)は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。(4)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管
してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製
品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 廣貫堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

36A4

使用期限

製造記号

かぜの初期症状に
葛根湯
肩・首筋のこわばり、
寒け、発熱、鼻づまり、
大棗 生姜 桂皮
甘草 麻黄 芍药

満量
処方

液体かぜ薬
葛根湯内服液N
30mL

第2類医薬品

本剤は本質的に沈殿物を含んでおります
ので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください
【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

消化器 吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称 症状

偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ガラス瓶 金属キャップ