

第2類医薬品

開け口

販売名：
ハリー葛根湯液2

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ミオパチー	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1 回 量	服薬回数
成人 (15才以上)	1本 (45mL)	1日2回
15才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は1回1本飲みきります。(3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、よく振ってから服用してください。

効 能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

成分・分量 1日量 90mL(45mL×2本)中
葛根湯エキス……………4.34g
(カッコ内8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物：キシリトール、スクロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、ポリオリキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造番号

かぜのひきはじめに ノンシュガー

葛根湯

眠くなる成分は入っておりません

ハリー葛根湯液2

第2類医薬品



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 生葉成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)