

第2類医薬品

開け口

ご使用に際して、外箱の
説明文を必ずお読みく
ださい。また、必要な時
に読めるよう商品と共に
大切に保管してくだ
さい。

販売名:
アトラスミン葛根湯液2

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、さびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5) 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

副作用被害救済制度
☎0120(149)931

使用期限
製造番号



用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1本 (45mL)	1日2回
15才未満	服用しないこと	

- ・食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- (1) 用法・用量を厳守してください。
 - (2) 本剤は1回1本飲みきりです。
 - (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

効能

体液中中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

成分・分量 90mL(45mL×2本)
葛根湯エキス……………4.34g
カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物：アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリニルアルコール(部分けん化物)、キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷺1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0120-584-419

受付時間：10時~16時(土、日、祝日を除く)