押して開ける

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)体の虚弱な人
   （体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4)胃腸の弱い人
   (5)発汗傾向の著しい人
   (6)高齢者
   (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8)次の症状のある人
   むくみ、排尿困難
   (9)次の診断を受けた人
   高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

満量処方

日本薬局方 葛根湯エキスの
生薬量最大の25g処方の生薬から
抽出して得られたエキスを
全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

阪本漢法の葛根湯（かっこんとう）

エキス顆粒

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

満量服少®　有効成分そのまま！　飲みやすくなりました（1包あたり3g→2g）

一歳の子供から大人まで服用できる

阪本漢法の葛根湯

エキス顆粒　かっこんとう

満量処方

セルフメディケーション税控除対象

42包

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】成人1日量3包（1包2.0g）中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分　量	成　分	分　量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

製造番号

使用期限

4 987076 628078

紙箱　プラ袋：PE，金属

S3

かぜのひきはじめに

感冒の初期・鼻かぜ 頭痛・肩こり

エキス顆粒 葛根湯

※眠くなる成分は入っていません

満量処方



第2類医薬品

セルフメディケーション 税控除対象

※写真はイメージです。

CAINZ

5260

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【販売名】
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 第2類医薬品

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分量	成　分	分量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

⚠使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4)胃腸の弱い人
   (5)発汗傾向の著しい人
   (6)高齢者
   (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
   (9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

かっ　こん　とう

葛根湯

満量処方

ひきはじめのかぜ、頭痛、肩こりに

体力中等度以上の方の次の諸症：感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、筋肉痛、手や肩の痛み

第2類医薬品

セルフメディケーション 税控除対象

顆粒

漢方製剤

第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

【販売名】 阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包2.0g)中　日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分　量	成　分	分　量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3) 体の虚弱な人
   （体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4) 胃腸の弱い人
   (5) 発汗傾向の著しい人
   (6) 高齢者
   (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8) 次の症状のある人
   むくみ、排尿困難
   (9) 次の診断を受けた人
   高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

葛根湯（かっこんとう）

満量処方

第2類医薬品

顆粒

満量処方

日本薬局方 葛根湯エキスの生薬量最大の25g処方の生薬から抽出して得られたエキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

満量処方

DAIKOKU

葛根湯（かっこんとう）

エキス顆粒

頭痛

感冒

肩こり

鼻かぜ

筋肉痛

生薬量25gの
葛根湯から抽出

セルフメディケーション
税控除対象

第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤
第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】成人1日量3包（1包2.0g）中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分 量	成　分	分 量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4)胃腸の弱い人
   (5)発汗傾向の著しい人
   (6)高齢者
   (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
   (9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの）、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり

第2類医薬品

葛根湯（かっこんとう）
エキス顆粒

満量処方

日本薬局方 葛根湯エキスの生薬量最大の25ｇ処方の生薬から抽出して得られた乾燥エキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

かぜのひきはじめに

セルフメディケーション 税控除対象

阪本漢法の 葛根湯（かっこんとう） エキス顆粒

日本薬局方葛根湯エキスの生薬量最大（25g）の生薬から抽出した

満量処方

眠くなる成分は入っていません



第2類医薬品

体力中等度以上のものの次の諸症

感冒の初期（汗をかいていないもの）、

鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤
第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包（1包2.0g）中　日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分　量	成　分	分　量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4)胃腸の弱い人
   (5)発汗傾向の著しい人
   (6)高齢者
   (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
   (9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

眠くなる成分は入っていません
1歳の子供から大人まで服用できます

葛根湯（かっこんとう）エキス顆粒

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期（汗をかいていないもの）、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり

日本薬局方葛根湯エキスの生薬量
最大（25g）の生薬から抽出した
満量処方

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】☎06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】株式会社阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1－5－12

眠くなる成分は
入っていません

Beisia

エキス顆粒 満量処方

葛根湯

かぜの初期諸症状に

セルフメディケーション
税控除対象

第２類医薬品

体力中等度以上
の方の次の諸症

感冒の初期
（汗をかいていないもの）

鼻かぜ
鼻炎

頭痛

肩こり
筋肉痛

手や肩の
痛み



この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

【販売名】
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

漢方製剤
第２類医薬品

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に服用してください。

年　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成　分	分　量	成　分	分　量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人
   (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
   (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
   (4)胃腸の弱い人
   (5)発汗傾向の著しい人
   (6)高齢者
   (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
   (8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
   (9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Beisia

葛根湯

エキス顆粒 満量処方

かぜの初期諸症状に

第２類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町１－５－１２

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931