

第2類医薬品



葛根湯

エキス顆粒



63包

第2類医薬品

日本薬局方葛根湯エキス最大の
25g処方から抽出して得られた
エキスを全量配合した顆粒剤

葛根湯



エキス顆粒
63包

第2類医薬品

日本薬局方葛根湯エキス最大の
25g処方から抽出して得られた
エキスを全量配合した顆粒剤

葛根湯



エキス顆粒
63包

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

押して開ける▶

漢方製剤
第2類医薬品

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンボー葛根湯顆粒

【特徴】

- 「葛根湯」は、体力が中等度以上の方の感冒の初期（汗をかいていない方）、鼻かぜ、頭痛、肩こりなどの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「葛根湯」の最大分量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください 生後3カ月未満の乳児

🗨️ **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】1日3回食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成分	分量	成分	分量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造番号

使用期限



紙箱 袋: PE、金属

S6