

### 【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 【用法・用量】

1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないこと	

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)食間とは食後2～3時間を指します。(3)本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じますので、よく振ってから服用してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 【お客様相談室】

☎ 06-6423-0565  
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

### 【製造販売元】

◆ 株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



# 処方 満量

かぜの  
ひきはじめ  
頭痛  
鼻かぜ  
肩こり

朝 夕  
1日 2回  
よく振って服用

眠くなる成分は入っていません

第2類医薬品

第2類医薬品

阪本漢法の  
**葛根湯**

かぜのひきはじめに

内服液2

日本薬局方 葛根湯エキス  
生薬量最大 25g処方  
を全量配合した内服液剤

本来の葛根湯の製法を  
守り製造しておりますので、  
よく振って服用してください。

朝  
夕  
1日2回  
よく振って服用

眠くなる成分は入っていません

服用前にこの箱の  
説明文書を必ず  
お読みください。

開封口

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の葛根湯内服液2

⚠️使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1日量2本(90mL)中 日局 葛根湯エキス 8.3g

日局 カッコン8.0g、日局 マオウ4.0g、日局 タイソウ4.0g、日局 ケイヒ3.0g、日局 シャクヤク3.0g、日局 カンゾウ2.0g、日局 ショウキョウ1.0g

より製した軟エキス

添加物:白糖、D-ソルビトール、スクラロース、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、香料、バニリン