

第2類医薬品

かっこんとうじょう

阪本漢法の葛根湯錠

錠剤

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】
阪本漢法の葛根湯錠

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】
1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回量	服用回数
成人 (15歳以上)	6 錠	1 日 3 回
7歳以上 15歳未満	4 錠	
5歳以上 7歳未満	3 錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 食間とは食後2～3時間を指します。

【お客様相談室】
☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日
10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

錠剤

54錠

かっこんとうじょう

阪本漢法の
葛根湯錠

満量処方

セルフメデケーション
税 控 除 対 象

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、
肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

満量処方

日本薬局方

葛根湯エキスの

生薬量最大の25g 処方の

生薬から抽出して

得られたエキスを
全量配合した錠剤

【成分・分量】

成人1日量18錠中
日局 葛根湯エキス 4.34g

成 分	分 量
日局 カッコン	8.0g
日局 マオウ	4.0g
日局 タイソウ	4.0g
日局 ケイヒ	3.0g
日局 シャクヤク	3.0g
日局 カンゾウ	2.0g
日局 ショウキョウ	1.0g

より製した乾燥エキス

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>
本剤は天然物（生薬）のエキスを
用いていますので、錠剤の色調等が
多少異なることがあります。

押して開ける

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
- | 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパシー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) めれた手で取り扱わないでください。（湿気は錠剤が変色する原因になります。）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 開封後はなるべく早く服用してください。



4 987076 626265

製造番号

使用期限



S2