

マイティ葛根湯液

第2類医薬品

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起したことがある人。
 - (8) 次の症状がある人。むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなりな
い場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

成人（15才以上）1回1本、1日3回食間に服用してください。

（15才未満は服用しないでください。）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。
- (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【成分・分量】 1日量〔3本（90mL）〕中

日局葛根湯エキス 15.0g（日局カッコン8.0g、日局マオウ4.0g、日局タイソウ4.0g、日局ケイヒ
3.0g、日局シャクヤク3.0g、日局カンゾウ2.0g、日局ショウキョウ
1.0g に相当）

添加物：D-ソルビトール、白糖、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベ
ン、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台1-9-6-1

お客様相談室 電話 045-593-2136

——本文は、ケースに記載されている事項です——

かぜの初期症状に

満量
処方

葛根湯液


鼻かぜ、頭痛
肩こり、筋肉痛



セルフメディケーション

税 控除 対象

体力中等度以上の方に 第2類医薬品



漢方製剤

販売名：マイティ葛根湯液

第2類
医薬品

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 1日量〔3本(90mL)〕中
日局葛根湯エキス…15.0g

日局カッコン…8.0g	日局マオウ…4.0g
日局タイソウ…4.0g	日局ケイヒ…3.0g
日局シャクヤク…3.0g	日局カンゾウ…2.0g
日局ショウキョウ…1.0g	に相当

添加物：D-ソルビトール、白糖、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール

【効能・効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間に服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)食間とは食後2~3時間を指します。
- (3)本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 ☎ 045-593-2136