

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偏アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 1日量[3本(90mL)]中
日局葛根湯エキス……15.0g

日局カクコン……8.0g	日局マオウ……4.0g
日局タイソウ……4.0g	日局ケイヒ……3.0g
日局シャクヤク……3.0g	日局カンゾウ……2.0g
日局ショウキョウ……1.0g	に相当

添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間に服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 食間とは食後2~3時間を指します。
- 本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)