

第2類医薬品

かぜのひきはじめに

葛根湯

エキス顆粒 MX

【使用上の注意】

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないで下さい
生後3ヶ月未満の乳児

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人 (8) むくみ、排尿困難の症状のある人 (9) 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 吐き気、食欲不振、胃部不快感
まれに下記の重複する症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称 症状
偽アルド 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感
ステロイド、 マイオバチー やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

第2類医薬品

<漢方製剤>
体力中等度以上の方に

鼻かぜ
頭痛
肩こり

眠くなる成分は
入っていません

3包(成人1日量)中
葛根湯エキス4300mg

カッコン 8.0g シャクヤク 3.0g
マオウ 4.0g カンゾウ 2.0g
タイソウ 4.0g ショウキョウ 1.0g
ケイヒ 3.0g

満量処方

30包
(1包1.7g)

税控除対象

かぜのひきはじめに
葛根湯
エキス
顆粒

MX



4A2

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町猪口7号



使用期限

製造番号

服用前に箇側面の説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒MX

【效能効果】 体力中等度以上のもの次の諸症: 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
【用法用量】

成人(15才以上) 1回 1包
7才以上15才未満 1回 2/3包
4才以上 7才未満 1回 1/2包
2才以上 4才未満 1回 1/3包
2才未満 1回 1/4包
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。●食間とは食後2~3時間をさします。
【用法用量に関する注意】

(1) 用法用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

【成分量】 3包(成人1日量)中
葛根湯エキス 4300mg
[カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、
ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、
ショウキョウ 1.0g]
添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、
乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所
に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所
に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで
下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、
袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して
下さい。(5) 表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話: (0748) 88-3180 (大代表)
受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話: 0120-149-931

葛根湯エキス
顆粒 MX



第2類医薬品

体力中等度の方に
鼻かぜ
頭痛
肩こり

3包(成人1日量)中
葛根湯エキス4300mg
カッコン 8.0g シャクヤク 3.0g
マオウ 4.0g カンゾウ 2.0g
タイソウ 3.0g ショウキョウ 1.0g
ケイヒ 3.0g

満量処方
(1包1.7g)