

鼻かぜ

肩こり

頭痛

漢方製剤

体力中等度以上の方に

眠くなりにくい
漢方のかぜ薬

かぜ

満量処方

のひきはじめに

葛根湯液

第2類医薬品

朝 1日 夕

よく振ってから
服用して下さい

かぜ

のひきはじめに

葛根湯液

第2類医薬品

鼻かぜ

肩こり

頭痛

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町南02-3

第2類医薬品

開け口

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

葛根湯液EX2

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人
(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)表示の期限内に服用して下さい。

●保管上の注意●

生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

● 食間とは食後2~3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】90mL(45mL×2本)中

葛根湯エキス 4340mg

カッコン	8.0g
マオウ	4.0g
タイソウ	4.0g
ケイヒ	3.0g
シャクヤク	3.0g
カンゾウ	2.0g
ショウキョウ	1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

- 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931