

セルフメディケーション

税 控除 対象

# かぜ

のひきはじめに

鼻かぜ

肩こり

頭痛

体力中等度以上の方に

眠くなる成分は入っていません



第2類医薬品

＜漢方製剤＞

葛根湯  
顆粒エキス



## ⚠️【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) **次の人は服用しないで下さい**  
生後3ヵ月未満の乳児

## 🗨️ **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)むくみ、排尿困難の症状のある人(9)高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

服用前に箱側面の説明書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。



## 第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒WS-R

【**効能効果**】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 【**用法用量**】

成人(15才以上).....1回 1包  
7才以上15才未満.....1回 2/3包  
4才以上 7才未満.....1回 1/2包  
2才以上 4才未満.....1回 1/3包  
2才未満.....1回 1/4包  
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。●食間とは食後2~3時間をさします。

### ＜**用法用量に関連する注意**＞

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

### 【**成分分量**】

3包(成人1日量)中

葛根湯エキス(4/5量)..... 3483mg  
〔カッコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、ショウキョウ0.81g〕

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

### 【**保管及び取扱い上の注意**】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の期限内に服用して下さい。

### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748)88-3180(大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931



### 【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の方は服用しないで下さい  
生後3カ月未満の乳児

### ■ **相談すること**

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)むくみ、排尿困難の症状のある人(9)高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい



アルコールサ

第2類医薬品

税 控除 対象

# かぜの ひきはじめに

か っ こ ん と う

## 葛根湯エキス 顆粒

< 漢方製剤 >

眠くなる成分は入っていません



(1包1377mg)

服用前に箱側面の説明書きを必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品 葛根湯エキス顆粒WS-R

【効能効果】 体液中中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上).....1回 1包  
7才以上15才未満.....1回 2/3包  
4才以上 7才未満.....1回 1/2包  
2才以上 4才未満.....1回 1/3包  
2才未満.....1回 1/4包  
1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。●食間とは食後2~3時間をさします。

<用法用量に関連する注意>

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

【成分分量】

3包(成人1日量)中

葛根湯エキス(4/5量).....3483mg

カッコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、  
ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、  
ショウキョウ0.81g

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室  
電話：(0748)88-3180(大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元  
滋賀県製薬株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町池879