

満量処方

葛根湯液

眠くなる成分は入っていません

第2類医薬品

生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。



第2類医薬品

＜漢方製剤＞



税 控除 対象

かぜの
ひきはじめに

体力中等度以上の方の

鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり

満量処方

眠くなる成分は入っていません

葛根湯液



第2類医薬品

葛根湯液WS

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合)には5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●食間とは食後2~3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg
 カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
 ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、
 ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4)表示の期限内に服用して下さい。
- 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
 電話: (0748) 88-3180(大代表)
 受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話: 0120-149-931

かっ こん とう

葛根湯液【満量処方】

生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

税 控除 対象

第2類医薬品


かぜの ひきはじめに

かっ こん とう

葛根湯液

<漢方製剤>【満量処方】

よく振ってから服用して下さい



1日3回
食間に服用

第2類医薬品

葛根湯液WS

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●食間とは食後2~3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg
 カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
 ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、
 ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4)表示の期限内に服用して下さい。
- 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
 電話：(0748) 88-3180(大代表)
 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
 滋賀県甲賀市甲賀町滝879



漢方内服液〈満量処方〉

葛根湯



生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

セルフメディケーション

税 控除 対象

体力中等度以上の方の

かぜのひきはじめ

〈漢方製剤〉

第2類
医薬品

頭痛、肩こり、
手や肩の痛み、
鼻かぜ、鼻炎に

眠くなる成分は入っていません



第2類医薬品

葛根湯液WS

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●食間とは食後2~3時間をさします。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg
カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4)表示の期限内に服用して下さい。
- 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748) 88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町堀879