

救風葛根湯内服液S(漢方製剤)

第2類医薬品

30mL×3本入

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦または妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のたるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振などがあらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻づまり、鼻水、のどの痛み)

用法・用量

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないでください。

成分・分量 1日量 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4,340mg
 [カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
 ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンソウ2.0g、
 ショウキョウ1.0g]

添加物：白糖、D-ソルビール、ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシリ、香料

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限内に服用してください。
- (5)配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用してください。
- (6)生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931

1,350円(税別) 038520 SKSD902

発売元

常盤薬品工業株式会社

神戸市中央区港島中町6-13-1

NOEVIR GROUP

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地

使用期限

製造番号

