

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液II

かっ こん とう えき

クラシエの漢方

眠くなる成分は
入っておりません

かぜのひきはじめ、
頭痛に

葛根湯液II

かっ こん とう えき

クラシエの漢方

眠くなる成分は
入っておりません

漢方製剤

内服液

第2類医薬品

内服液

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：
クラシエ葛根湯液II

第2類医薬品

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(外箱及びピンラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。
- ピンをあけたら飲みきってください。
- ピンをあけたまま保存しないでください。

発売元
クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間
10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋島等173(〒939-3521)

副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931

〈効能〉

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈用法・用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用する。
15才未満は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 生薬抽出液剤のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

〈成分〉

成人1日の服用量90mL(45mL×2本)中
葛根湯抽出液A……………60mL
[カッコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより抽出。]
(葛根湯抽出液A 1mLは原生薬約0.42gに相当する。)

添加物として、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、ソルビタン脂肪酸エステル、香料、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、白糖、L-グルタミン、シリコーン樹脂、グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Naを含有する。