

ツムラの漢方内服液

葛根湯

かっこんとう

第2類医薬品

ツムラの漢方内服液

発熱やさむけがしてきたら…

かぜの初期症状、
頭痛、鼻かぜに

葛根湯


かっこんとう

第2類医薬品

体力中等度以上の方に



30mL×3本(1日分)



ツムラの漢方内服液

かぜの初期症状
頭痛、鼻かぜに

葛根湯

かっこんとう

第2類医薬品



30mL



30mL

第2類医薬品

押してあける

外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください。

【販売名】 ツムラ漢方内服液葛根湯

△【使用上の注意】

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉


本剤は1回1本の服用で飲みきり、のみ残しのないようにしてください。

【保管および取り扱い上の注意】


(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

【包 装】 30mL×3本入(1日分)

製造番号
使用期限



発売元



お客様相談窓口
電話 0120-329-930
<https://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元
大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214番地1

【成分・分量】

本品1日量90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カクコン…8.0g	日局シヤク…3.0g
日局マオウ…4.0g	日局カンゾウ…2.0g
日局タイソウ…4.0g	日局シウキョウ…1.0g
日局ケイヒ…3.0g	

添加物として転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、日局ハチミツ、日局安息香酸ナトリウム、日局パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、日局クエン酸水和物、日局炭酸水素ナトリウム、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、プロピレングリコールを含有します。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

ツムラの漢方内服液

かぜの初期症状
頭痛、鼻かぜに

葛根湯

かっこんとう

第2類医薬品



30mL

【販売名】 ツムラ漢方内服液葛根湯

【成分・分量】 本品1日量90mL(30mL×3本)中、
以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カッコン…8.0g	日局シャクヤク…3.0g
日局マオウ…4.0g	日局カンゾウ…2.0g
日局タイソウ…4.0g	日局ショウキョウ…1.0g
日局ケイヒ…3.0g	

【効能・効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期
(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、
手や肩の痛み

【用法・用量】 次の量を、食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

【注意】 (1)服用に際しては、箱の裏面の説明文書をよくお読みくだ
さい。(2)服用が適さない場合がありますので、服用前に医師、薬剤
師または登録販売者に相談してください。(3)直射日光の当たらな
い涼しい所に保管してください。(4)小児の手の届かない所に保管し
てください。(5)誤用をさげ、品質を保持するために、他の容器に入
れかえないでください。(6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないで
ください。

発売元



株式会社ツムラ

東京都港区赤坂2-17-11

〒107-8521

お客様相談窓口

電話 0120-329-930

<https://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 大同薬品工業株式会社 奈良県葛城市新村214番地1

製造番号

使用期限