

▲ 使用上の注意

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

使用期限  
製造番号

# かぜのひきはじめ 初期症状

満量処方

# 葛根湯

1日2回  
食間に服用

【眠くなる成分が入っていない】

第2類医薬品 45mL

販売名：トピック葛根湯内服液 D2

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】次の量を、食間によく振ってから服用してください。(食間とは「食事と食事の間」のことを指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1本	2回
15歳未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 本剤は1回1本飲みきりです。(3) 生薬抽出剤のため、本剤は本質的に沈殿を含みます。服用前によく振ってから服用してください。

【成分・分量】1日の服用量 90mL(45mL×2本)中・葛根湯エキス：7.1g(日局カクコン8.0g、日局マオウ4.0g、日局タイソウ4.0g、日局ケイヒ3.0g、日局シャクヤク3.0g、日局カンゾウ2.0g、日局ショウキョウ1.0gより抽出)

添加物：精製白糖、ブドウ糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ安息香酸ブチル、安息香酸ナトリウム、香料、エタノール、プロピレングリコール

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) ビンを開けたら飲みきってください。

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

お問い合わせ先 ☎0120-415-688

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：ビン

金属：キャップ