

△ 使用上の注意

■ 相違すること 1 次の人服前には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 他の疾患のある人(体力の衰えている人、他の薬の人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発症、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人、むくみ、排尿困難(③次の症状を受けた人、貧血、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください)

服用部位	症 状
皮 膚	発症、発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
血アルドステロン症	手足のむくみ、しびれ、つばの感、やけどに似て、喉の痛み、首の痛み、顔の腫れ、顔の赤み、全身の痛みがあらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発赤、黄疸(皮膚や白目が黄くなる)、尿の色、全身の痛み、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感服の初期、量かぜ、頭痛に服用する場合)は一日一回服用しても効果があらわれない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用期限
製造番号

満量処方

かぜのひきはじめに…

葛根湯

液

第2類医薬品 30mL

眠くなる成分は入っていません

販売名：満量 葛根湯内服液N

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかくていないもの)、寒かぜ、喉炎、咽痛、口内炎、手や足の痛み

【用法・用量】次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。(食間とは「食事と食事の間」のことをいいます。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください。	

＜用法、用量に關する注意＞

(1) 定められた用法、用量を厳守してください。(2) 本剤は1回1本飲みきります。(3) 生薬抽出液のため、本剤は本剤的に沈澱を含みます。服用前によく振ってから服用してください。

【成分・分量】1日の服用量90mL(30mL×3本)中
葛根湯エキス4.54g(1日6回分)0.09g、白濁マ
オウ4.0g、白濁マイン4.0g、白濁マイン3.0g、白
濁マイン2.0g、白濁マイン2.0g、白濁マイン
2.0gより抽出)

添加物：精製白糖、ブドウ糖、ポリオキシエチレン、酸化ヒマシ油、パラオキシ安息香酸ブ
ル、安息香酸Na

【保存及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 誤用の原因となったり、品質が変わります。(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(6) ピンを開けたら飲みきってください。

製造販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田猪野80-1
お問い合わせ先 ☎0120-415-688
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

市用紙書投函制度 ☎0120-149-031 ガラス：ビ
金庫：キャップ