

▲使用上の注意

【相対する点】1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(1)従前の病気を患っている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)体の虚ろな人(体の冷えている人、体の暖かい人)。(4)腎臓の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今まで二重などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(次の症状を併発した)。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃痛・不快感

また下記に重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	手足のふるえ、しびれ、つばざり感
ミオパチー	やこばりに加えて、腕力減、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、嘔吐感、全身のたるさ、食欲不振などがあらわれる。

3.1ヶ月位(経年の初期、暑かぜ、頭痛に服用する場合)以上一週間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。4.長期連用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

使用期限
製造番号

感冒の初期*
(汗をかいていないもの、
肩こり)*

葛根湯
内服液

葛根湯エキス配合

分量処方

by amazon

*体力中程度以上の方に

30mL

第2類医薬品

トピック葛根湯液

販売名：トピック葛根湯液

【効能・効果】体力中程度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、暑かぜ、寒気、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
【用法・用量】次の量で、食前または食間によく飲ってから服用してください。(食前とは食事の開始とは異なります。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないてください。	

＜用法・用量に關する注意＞

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)生薬抽出剤のため、本剤は本質的に沈澱を含みます。服用前によく振ってから服用してください。

【成分・分量】1日の服用量90mL(30mL×3)中
葛根湯エキス3.4g(1回1カプセル0.6g、1日4回ずつ0.4g、日毎タイフ4.0g、日毎ケイビ3.0g、日毎シヤクヤク3.0g、日毎カンゾウ2.0g、日毎ショウキョウ1.0gより抽出)

添加物：精製白糖、ブドウ糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマツ油、パラオキシ安息香酸ブチル、安息香酸Na

【保存及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因)により、品質が変わります。(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5)ビンを開けたら飲みきってください。

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田端野80-1
お問合わせ先 ☎0120-415-688
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

直売用電話番号(京都) ☎0120-149-931 | ガラス：ピン
金属：キャップ