

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。なお、医薬品の作用は、体質又は体調により異なることがありますので、本剤を自ら服用されるために購入された以外の方が服用されるときは、あらかじめ本剤の購入先にご相談ください。



葛根湯配合かぜ薬

コデジール[®]顆粒

第②類医薬品

コデジール顆粒は、古くから発熱、寒気、頭痛などを治すかぜ薬として用いられている漢方薬の葛根湯[葛根(かっこん)、芍薬(しゃくやく)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、桂皮(けいひ)、麻黄(まおう)、甘草(かんぞう)の七種の生薬からなる]の乾燥エキスに、解熱鎮痛効果のあるアスピリンアルミニウムを加え、鎮咳剤、抗ヒスタミン剤などを配合したかぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - 15歳未満の小児
 - 出産予定日12週以内の妊婦
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中での痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむげ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■ 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上(大人)	1 包	3 回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

3包(1日量)中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	は た ら き
葛根湯乾燥エキス (葛根湯5,625mgに相当)	1,125mg	かぜの諸症状を緩和します。
アスピリンアルミニウム	1,530mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	21mg	せきをしずめます。
無水カフェイン	120mg	頭痛をやわらげます。

添加物としてセルロース、無水ケイ酸、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ その他

本剤は生薬抽出成分を配合していますので、製品により顆粒の色が多少異なる場合がありますが、薬効にかわりはありません。

■ お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
 日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
 電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)