

漢方濃縮煎劑葛根湯<sup>かっこんとう</sup>1

 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4)胃腸の弱い人
- (5)発汗傾向の著しい人
- (6)高齢者
- (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8)次の症状のある人　むくみ、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人　高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加え、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に約100mLのお湯に溶かして服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
15歳未満	服用しないでください	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)開封前によく振り、開封後はすみやかに服用してください。
- (3)分包の開封時に内容液が飛び散らないよう注意してください。

## 成分・分量

1日量2包(12.5g)中

葛根湯抽出物 ..... 12.5g

（カッコン .....8.0g	ケイヒ.....3.0g
マオウ .....4.0g	シャクヤク.....3.0g
ショウキョウ .....1.0g	カンゾウ.....2.0g
タイソウ .....4.0g	

添加物として、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なったり、沈殿を生じる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)携帯するときは、分包が折れ曲がらないようにしてください。

## お問い合わせ先

星製薬株式会社

☎0120-179-033

受付時間 9:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

発売元

**Hoshi** 星製薬株式会社

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

製造販売元

 松浦薬業株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21