

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存してください。



かつこんとう 錠剤 葛根湯

第2類医薬品



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸の弱い人。
 - (5)発汗傾向の著しい人。
 - (6)高齢者。
 - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
排尿困難
(9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〔用法・用量〕

食前1時間、温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～5錠	3回

〔成分・分量〕(本剤100錠中)

日局	ケイヒ末	3.0g	別紙規格 カッコン末	8.0g
日局	シャクヤク末	3.0g	別紙規格 マオウ末	4.0g
日局	カンゾウ末	2.0g	別紙規格 タイソウ末	4.0g
日局	ショウキョウ末	1.0g		

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守ってください。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

発売元 **イスクラ産業株式会社**
東京都中央区日本橋1-14-2
製造元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10
販売元