

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

葛根湯は一般に、“かぜの漢方薬”として広く知られています。かぜの初期症状の他、頭痛、肩こり、筋肉痛にも効果のある漢方処方です。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害者

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルデステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

本品1包を400mlの水をもって煮て200mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前3回に分服する。

年 齢	1日服用回数
大人（15歳以上）	3回
15歳未満	服用しないでください

成分・分量（1日量：1包17g中）

成 分	含 量	成 分	含 量
日局 カッココン	4g	日局 ケ イ ヒ	2g
日局 マ オ ウ	3g	日局 シャクヤク	2g
日局 ショウキョウ	1g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	3g		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質かわかる。）

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
電話：(076) 431-7017 FAX：(076) 431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元：株式会社 延寿堂

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3

いけだや

葛根湯

かぜ・肩こり・筋肉痛

いけだや 葛根湯

第2類医薬品

成分・分量(1日量:1包17g中)

日本薬局方 カッコン	4g	日本薬局方 ケ イ ヒ	2g
日本薬局方 マ オ ウ	3g	日本薬局方 シャクヤク	2g
日本薬局方 ショウキョウ	1g	日本薬局方 カンゾウ	2g
日本薬局方 タイソウ	3g		

〈用法・用量〉

大人(15歳以上) 1包を400mlの水をもって煮て200mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前3回に分服する。

〈効能・効果〉

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈注 意〉

- 1.服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 2.服用に際しては、説明文書(裏面)をよく読んでください。
- 3.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

◎脱酸素剤が入れてありますので、煎じるときに誤って入れないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

発 売 元 株式会社 池田屋安兵衛商店
〒930-0046 富山県富山市堤町通り1-3-5
電話(076)425-1871

製造販売元 株式会社 延寿堂
〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

3包入(3日分)



4 957492 000307



内袋: PP
外袋: PE, PA

池田屋安兵衛商店

第2類医薬品

かぜ・肩こり
いけだや
葛根湯

