

第2類医薬品

ご使用に際してはこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要などきに読めるよう大切に保管して下さい

◆角野の漢方製剤
角野葛根湯

角野葛根湯は漢方処方に従って、生薬を配合して製した煎剤で、特異な芳香があります。



〈使用上の注意〉



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人には服用しないこと

生後3ヶ月未満の乳児

長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- 4) 胃腸の弱い人。
- 5) 発汗傾向の著しい人。
- 6) 高齢者。
- 7) 今までに薬により発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- 9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる頭痛等があらわれる。

(2) 1ヶ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合は5~6回)服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

大人（15才以上）は本品1包を和紙袋入りのまま、水約400mlを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて、1日に3回食前に服用する。

服用に際して、次のことに注意すること

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- 2) 生後3ヶ月以上であっても1才未満の乳児には、やむを得ない場合の他は、服用させないこと。
- 3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1日量（1包） 17g中

カッコン	4.0g
マオウ	3.0g
ショウキョウ	1.0g
カンゾウ	2.0g
タイソウ	3.0g
ケイヒ	2.0g
シャクヤク	2.0g

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しいところに（密栓して）保管すること。
- 2) 小児の手の届かないところに保管すること。

お問い合わせ先

本製品に対するお問い合わせは、下記にお願いします。

有限会社 角野製薬所 Tel. 0994-58-7978

受付時間 月曜日を除く午後1時から6時まで

製造販売元 有限会社 角野製薬所

〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名5756