

第2類医薬品

眠くならない

かぜ漢方内服液DX

葛根湯

かぜの初期の諸症状

さむけ、発熱、頭痛、鼻水

液体かぜ薬

第2類医薬品

眠くならない

葛根湯

かぜの初期の諸症状

さむけ、発熱、頭痛、鼻水

眠くならない
かぜ漢方内服液DX
第2類医薬品

かぜの初期の諸症状
さむけ、発熱、頭痛、鼻水
かぜ漢方内服液DX
第2類医薬品



かぜの初期の諸症状

さむけ、発熱、頭痛、鼻水
かぜ漢方内服液DX
第2類医薬品

(30mL×3)

かぜ漢方内服液DX

第2類医薬品

葛根湯

液体かぜ薬



販売名：かぜ漢方
内服液DX

第2類医薬品

△ご使用上の注意

してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕
短期間の服用にごとどく、適用は避けてください。

相談すること

1. 次の人には服薬前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 (1) 医師の治療を受けている人
 (2) 診療又は妊娠していると思われる人
 (3) 妊娠中の婦人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 (4) 高齢の婦人
 (5) 女子病向の弱い人
 (6) 高齢者
 (7) 今までに薬により発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談ください。

- (1) 第1回後、次の症状があらわれた場合

〔體系部位別 症状〕

皮膚部 発癬・発赤・かゆみ

消化器部 悪心・食欲不振・胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

使用期限

製造番号

30mL×3本(1日分)



よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水)

【用法・用量】

次の量を食間に服用する。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1本	[1日3回(健常)]
15歳未満		服用しないこと

●定められた用法、用量を厳守してください。

●よく振ってから服用してください。

【成分・分量】

1日量900mL(30mL×3本) 中

葛根湯濃縮液 60mL

〔日局ガッコソ 8.0g 日局シャクヤク 3.0g〕

日局マオウ 4.0g 日局カンゾウ 2.0g

日局タゾウ 4.0g 日局ショウキョウ 1.0g

日局ケイヒ 3.0g

添加物として白糖、ローリエトロール、ポリオキシエチレン硬軟ヒマシ油、アラベン、安息香酸ナトリウム、プロピレングリコール、香料を含有します。

●本剤はお薬エキスを配合しているため、まれに沈殿を生じる場合がありますが、薄茶色に変わるのはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

〔1〕直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

〔2〕小児の手の届かない所に保管してください。

〔3〕他の容器に入れないでください。

〔4〕(誤用の原因になったり品質が変化します。)

〔4〕使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元 **Kinyo** 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451