

# 液体のかぜ薬

かぜの初期の諸症状に!!

**肩・首筋のこわばり、発熱  
さむけ、頭痛、鼻水、鼻閉**



かぜの初期の諸症状に!!

# 液体のかぜ薬

レオスミン漢方内服液

第2類医薬品

# 葛根湯

**肩・首筋のこわばり  
さむけ、発熱、頭痛**

30mL×3本(1日分)



14021A

かぜの初期の諸症状に!!

# 葛根湯

内服液



4 987347 202457

販売名：レオスミン  
漢方内服液

第2類医薬品



△ご使用上の注意

してはいけないこと ☒

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】  
短期間の服用にとどめ、運用は避けてください。

相談すること ☑

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つぼり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。    |
| 肝 機 能 障 害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 3.5〜6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

使用期限

製造番号

30mL×3本(1日分)  
¥1,350+税



よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状（発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み）

【用法・用量】 次の量を食間によく振ってから服用する。

| 年 齢       | 1回量     | 服用回数     |
|-----------|---------|----------|
| 成人(15才以上) | 1本      | 1日3回(食間) |
| 15才未満     | 服用しないこと |          |

●定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量90mL(30mL×3本)中

|        |      |          |      |
|--------|------|----------|------|
| 葛根湯濃縮液 | 60mL |          |      |
| 日局カクコン | 8.0g | 日局シャクヤク  | 3.0g |
| 日局マオウ  | 4.0g | 日局カンゾウ   | 2.0g |
| 日局タイソウ | 4.0g | 日局ショウキョウ | 1.0g |
| 日局ケイヒ  | 3.0g |          |      |

添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、安息香酸ナトリウム、プロピレングリコール、香料、アルコール、グリセリン、パニリン、エチルパラニリンを含みます。

●生薬成分を含むため、沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になりたり品質が変化します。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **Kinyo** 金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451