＊2026年8月改訂（使用上の注意の改訂）

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

かぜ薬

新生カッコンBC顆粒

特　徴

●古くから<かぜ>に用いられてきた漢方処方「葛根湯」を配合したかぜ薬です。
●かぜで失われがちなビタミンC、ビタミンB_1、ビタミンB_2を配合しています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

フェニルケトン尿症の人（本剤はアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）を含んでいます）

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4)胃腸の弱い人
(5)発汗傾向の著しい人
(6)高齢者
(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8)次の症状のある人
　むくみ、排尿困難
(9)次の診断を受けた人
　高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
＊ 多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（裏面につづきます）

効　能
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量
成人（15才以上）1回1包、1日3回朝昼夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用する。またはお湯に溶かしてよくかきまぜた後、温服する。
15才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)お湯に溶かして服用する場合は、よくかきまぜないと溶け残りを生じることがありますが、残さずに服用してください。

成　分
成人1日の服用量3包（1包1.73g）中、次の成分を含んでいます。
葛根湯エキス…… 4.4g
（カッコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより抽出。）
ビスベンチアミン（ビタミンB_1誘導体）…… 25.0mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB_2酪酸エステル）…… 12.0mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）……500.0mg
添加物として、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸Mg、D-マンニトールを含有する。

〈成分に関連する注意〉
(1)本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色くなることがあります。
(2)本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
(3)本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
クラシエ 薬品株式会社　お客様相談窓口 ☎(03) 5446-3334
受付時間　10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ　www.kracie.co.jp

発 売 元　**クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元　**新生薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町清水谷1269（〒635-0103）