

ひきはじめの**かぜ**
発熱・寒け
肩・首筋のこわばり

朝と夜**1日2回**

葛根湯

満量処方
カコナミン[®]
葛根湯液**2**

朝
・
夜

液体かぜ薬
眠くなる成分を含まない

第2類医薬品

45mL×4本(2日分)



カコナミン[®]葛根湯液**2**

第2類医薬品

そのまま飲める液体かぜ薬

「カコナミン葛根湯液2」は、そのまま服用できる液体かぜ薬です。伝統的な漢方煎じ薬の製法にのっとり、生薬の力を大切に活かして水製抽出した葛根湯ですので、かぜの初期症状によく効きます。



肩・首筋のこわばり



寒け



発熱



のどの痛み

カコナミン[®]葛根湯液²

押して開ける

第2類医薬品

ケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

△【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼれに増えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【成分・分量】

本品1日量 90mL (45mL×2本) 中
葛根湯抽出エキス(下記生薬の水製抽出液)54mL
[日局カクコン…8g 日局マ オウ…4g
日局 タイノウ…4g 日局 ケ イ ヒ…3g
日局 シャクヤク…3g 日局 カンゾウ…2g
日局 ショウキョウ…1g

添加物: D-ソルビトール、白糖、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料

【用法・用量】

次の量を、朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限(ケース及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)ピンをあけたら飲みきってください。
- (6)ピンをあけたまま保存しないでください。

【お問い合わせ先】

新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

45mL×4本(2日分)

本体価格 ¥1,600+税



カコナミン[®]葛根湯液²

第2類医薬品

満量処方とは

漢方薬の「葛根湯」は、7種類の生薬が含まれていますが、日本薬局方葛根湯 25g 処方より得られる抽出エキスを1日最大量(全量)配合していることを意味します。



肩・首筋のこわばり



寒け



発熱



のどの痛み