

第2類医薬品

かぜ

初期のかぜ
肩こり、寒け

《液体》

第2類医薬品

ビューンかぜ漢方内服液2



45mL×4本

中京医薬品

眠くなる成分を含みません

「ビューンかぜ漢方内服液2」は、眠くなる成分を含まない為、日中家事や仕事をしなければならない方の味方です。また、服用しやすい液体タイプのかぜ薬です。



肩・首筋のこわばり



寒け



発熱



のどの痛み

第2類医薬品

販売名:ビュンかぜ
漢方内服液2

押してあけて
ください。

ケースは本剤とともに保管し、
服用の際には必ずお読みください。

△【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでくだ
さい。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください(1)医師の
治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠して
いると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰
えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。
(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今
までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等
を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。
むくみ、排便困難9次の診断を受けた人。高
血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに服用
を中止し、このケースを持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることが ある。その場合は直ちに医師の診察を受 けてください。
症状の名称	症 状
偽アルドステ ロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つば り感やこわばりに加えて、 腕力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くな る)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない
場合は服用を中止し、このケースを持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・
首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【成分・分量】

本品1日量 90mL (45mL×2本) 中
葛根湯抽出エキス(下記生薬の水製抽出液)54mL
[日局カクコン…8g 日局マ オ ウ…4g]
[日局タイソウ…4g 日局ケ イ ヒ…3g]
[日局シャクヤク…3g 日局カンソウ…2g]
[日局ショウキョウ…1g]

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸ナ
トリウム、パラベン、香料

【用法・用量】

次の量を、朝夕、食前又は食間によく振って
から服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間で、前の食から
2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいます
ので、服用前によく振ってから服用して
ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管
してください。(2)小児の手の届かない所
に保管してください。(3)他の容器に入れ替
えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)(4)配置期限(ケース
及びビラベルに記載)を過ぎた製品は
服用しないでください。(5)ピンをあけたら飲
みきってください。(6)ピンをあけたまま保
存しないでください。

よく効く「満量処方」の葛根湯

葛根湯には、カクコン、タイソウなど、7
種類の生薬が配合されています。
各生薬には配合できる最大量がそれぞ
れ決められています。(カクコンは一日
量8gまで、タイソウは4gまで、など)
「ビュンかぜ漢方内服液2」は、7種
類の生薬すべてを最大量配合した「満
量処方」の葛根湯ですので、かぜの諸
症状によく効きます。

〈お問い合わせ先〉

本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

45mL×4本入り(2日分)
本体価格 ¥1,580+税

〈発売元〉



株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1



世界の子供たちに健康と教育を
国際貢献活動を支えます
この商品の売り上げの一部は
「きずなASSIST基金」に寄付されます。