

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	朝昼夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用してください。又はお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服してください。
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)2歳以上の幼児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。

第2類医薬品 葛根湯満量顆粒

ケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

【成分・分量】 1日分 3包(1包1.6g)中

日局葛根湯エキス(乾燥).....4.4g

日局カッコン 8g、日局マオウ 4g、日局タイソウ 4g、日局ケイヒ 3g、日局シャクヤク 3g、日局カンゾウ 2g、日局ショウキョウ 1gより抽出。

添加物としてD-マンニトール、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

<成分・分量に関連する注意>

本剤は、天然物(生薬)のエキスを用いていますので顆粒の色が多少異なることがあります。

【効能・効果】

かぜの初期症状、鼻かぜ又はかぜによる頭痛若しくは肩こり

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。


症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

内容量 10包(1包1.6g) 希望小売価格 1,200円+税

発売元  **株式会社太陽薬品**
大阪府高槻市野見町1番18号

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町清水谷1269

押しあける