

▲
押して開ける



服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

販売名:アズマリン葛根湯シロップ **第2類医薬品**

〔効能・効果〕
体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〔用法・用量〕
次の量を1日2回食間に、よく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を
厳守してください。

〔成分・分量〕
2本(90mL) (大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成分	2本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
安息香酸Na、バラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

販売元
本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元
大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

セルフメディケーション
税 控除 対象



4 987334 201852

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4)胃腸の弱い人。
(5)発汗傾向の著しい人。
(6)高齢者。
(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難
(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

満量処方

セルフメディケーション
税 控除 対象

葛根湯

シロップ

1日2回

かぜのひきはじめに

頭痛、肩こり、筋肉痛

眠くなる成分は入っていません。



満量処方 第2類医薬品

葛根湯

シロップ

かぜのひきはじめに
頭痛、肩こり、筋肉痛

45mL
1日2回
飲みやすいシナモン味

飲みやすいシナモン味

45mL×2本
(1日分)

第2類医薬品

- 3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 〔保管及び取扱い上の注意〕
- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 本草製薬株式会社
(商品に関するご質問・お問い合わせ)
☎052-892-1287 (代表)
(9:00~17:00/土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)



ガラス:瓶 金属:キャップ

第2類医薬品

服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

販売名:アズマリン葛根湯シロップ

〔効能・効果〕

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〔用法・用量〕

次の量を1日2回食間に、よく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を
厳守してください。

〔成分・分量〕

2本(90mL) (大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成分	2本中
葛根湯エキス(カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
安息香酸Na、バラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

販売元

本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元

大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 胃腸の弱い人。
(5) 発汗傾向の著しい人。
(6) 高齢者。
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

1日2回

飲みやすいシナモン味

葛根湯

かっこんとう

シロップ

かぜの
ひきはじめ
頭痛・肩こり



● 眠くなる成分は入っていません。

45mL×2本
1日分

体力中等以上のものの次の諸症感冒の初期(汗をかいていないもの)、頭痛、肩こり

第2類医薬品

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】本草製薬株式会社
(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎052-892-1287 (代表)
(9:00~17:00/土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)



ガラス:瓶 金属:キャップ



4 987334 201487