

ゼリスン葛根湯内服液

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。
(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬により発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難。(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. この場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ
消化器	恶心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

服用に際して、この説明文を必ず読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量

次の量を1日3回食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。

成 分・量

3本(90mL) [大人1日服用量] 中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タインウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオリキシチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(β-メントール)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤には生葉エキスが配合されているために、沈でんを生じることがありますが、このような場合にはよく振りませて服用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発 売 元 株式会社 カツセイシステム
岐阜市芥見堀田78番地の1

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

お客様相談室 058-271-9481
(9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

