

かぜの初期症状に

カゼコール®

眠くなる成分は
入っていません。

内服液

かぜの初期症状に
カゼコール®

眠くなる成分は
入っていません。 内服液

さむけ

頭痛

のどの痛み

肩・首筋のこわばり

第2類医薬品

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15



カゼコール®内服液

開封口

第2類医薬品

1回1本、1日3回

漢方薬 [販売名] カゼコール内服液

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、(4) 胃腸の弱い人、(5) 発汗傾向の著しい人、(6) 高齢者、(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人、(8) 次の症状のある人、むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

[成分・分量] 1日量90mL(30mL×3本)中
葛根湯濃縮液…45mL

カッコン	8g	マオウ	4g
タイソウ	4g	ケイヒ	3g
シャクヤク	3g	カンゾウ	2g
ショウキョウ	1g		

添加物としてパラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、白糖、ハチミツを含有します。

[効能]

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

[用法・用量] 次の量を食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

なお、よく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5) 本剤は1回1本を飲みきりとし、分割服用はしないでください。

[その他の注意]

(1) 本剤は混濁したり、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15

⚠ 使用上の注意  相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人、(2)妊婦又は妊娠していると思われる人、(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、(4)胃腸の弱い人、(5)発汗傾向の著しい人、(6)高齢者、(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人、(8)次の症状のある人、むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ〔消化器〕吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。〔偽アルドステロン症、ミオパチー〕手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。〔肝機能障害〕発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お問合せ先
日邦薬品工業株式会社
お客様相談室: ☎ 03(3370)7174(代)

使用期限

30mL
かぜの初期症状に
カゼコール®
眠くなる成分は
入っていません。
内服液

さ む け

頭 痛

のどの痛み

肩・首筋のこわばり



発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15

第2類医薬品

漢方薬 [販売名] カゼコール内服液
[効 能] 体力中等度以上のものの次の諸症:
感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
[用法・用量] 成人(15歳以上)1回1本、1日3回 食間に服用してください。なお、よく振ってから服用してください。
〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は小児(15歳未満)には服用させないでください。

[成分・分量] 1日量90mL(30mL×3本)中
葛根湯濃縮液… 45mL

〔カクコン8g、タイソウ4g、シャクヤク3g、ショウキョウ1g、マオウ4g、ケイヒ3g、カンゾウ2g〕

添加物としてパラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、白糖、ハチミツを含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
(5)本剤は1回1本を飲みきりとし、分割服用はしないでください。

[その他の注意]

(1)本剤は混濁したり、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ

A9



4