

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤
ニタンダ

葛根湯エキス顆粒

第2類医薬品

「漢方薬」といえば「葛根湯」といわれるほどに、「かぜ・肩こりの薬」として知られています。

かぜのひき初めは、からだがぞくぞくし、いくらあたたかくしても寒気がとれず、気持ちの悪い状態がつづきます。同時に頭痛がして、首すじや肩がこってきて、頭が重苦しく、発熱し、鼻水がでたり、関節等も痛んだりします。

「ニタンダ葛根湯エキス顆粒」はふんわりした溶けやすい顆粒で、かぜの初期症状、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こりに効果があります。

かぜは早めのお手当が大切です。「かぜをひいたかな」と思ったらすぐに本剤をご服用下さい。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈成分・分量〉

1日量3包(9g)中に葛根湯乾燥エキスが4.34g含まれています。

カッコン(葛根)	8g
マオウ(麻黄)	4g
タイソウ(大棗)	4g
ケイヒ(桂皮)	3g
シャクヤク(芍薬)	3g
カンゾウ(甘草)	2g
ショウキョウ(生姜)	1g

より抽出。

添加物として乳糖、セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

〈効能・効果〉


かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは…食後2~3時間を目指します。

年齢	1回量
15歳以上	1包
7~14歳	2/3包
4~6歳	1/2包
2~3歳	1/3包
2歳未満	服用しないこと



用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号