

TRADE MARK



かぜの初期
鼻 か ぜ
肩 こ り

漢方製剤

増田葛根湯エキス顆粒



第2類医薬品

4-0
1605

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。(5)配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

用法・用量	大人(15才以上).....1回1包
15才未満7才以上	1回 $\frac{2}{3}$ 包
7才未満4才以上	1回 $\frac{1}{2}$ 包
4才未満2才以上	1回 $\frac{1}{3}$ 包
1日3回食間に水または白湯で服用する。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)2才未満の乳幼児には服用させないこと。
- (2)定められた用法・用量を厳守すること。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

服用に際しては、この説明文書をよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
短期間の服用にとどめ、連用しないこと

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオバチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

成分・分量

3包中 カッコン湯乾燥エキス----- 990mg

次のカッコン湯原生薬に相当

カッコン	…2,329mg	ケイヒ	…1,165mg
マオウ	…1,747mg	シャクヤク	…1,165mg
ショウキョウ	…582mg	カンゾウ	…1,165mg
タイソウ	…1,747mg		

添加物としてD-マンニトール、無水ケイ酸、乳糖、パレイショデンプンを含有する。

製造販売元

増田製薬株式会社

奈良県橿原市川西町429

お客様相談窓口 0744-27-4381

苗
し
せ
け
ん

紙

6包入(1包1.7g) ¥ 700+税

配置期限