

葛根湯 (三星)

(効能又は効果)

かぜの初期、鼻かぜ
かぜによる頭重、肩こり

(用法及び用量)

大人1日1包に水約500mlを加えて半量まで煎じつめ紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間(空腹時)に温服する。

7歳以上15歳未満	大人の2/3
4歳以上7歳未満	大人の1/2
2歳以上4歳未満	大人の1/3
2歳未満3ヶ月以上	大人の1/4以下を服用

(用法及び用量に関する注意)

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
- (3) 幼児に服用させる場合には、やけどをしないようによく注意すること。

製造販売元： 三星製薬株式会社
(お問い合わせ先) 奈良県御所市153番地
電話：0745-65-2130

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

【成分及び分量】 1包 17g 中

カッコン	・ ・ 4.0g	マオウ	・ ・ 3.0g	ショウキョウ	・ 1.0g
タイソウ	・ ・ ・ 3.0g	ケイヒ	・ ・ 2.0g	シャクヤク	・ ・ 2.0g
カンゾウ	・ ・ ・ 2.0g				

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり 副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと：生後3ヶ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。
 - (7)今までに薬などにより発疹 発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難。
 - (9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹 発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こる事がある。その場合は直ちに医師の診断を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)期限の過ぎた製品は服用しないこと。