

満量
処方

 井藤漢方製薬

かぜのひきはじめ
頭痛・肩こりに

飲み
やすい
錠剤タイプ

葛根湯

エキス錠



第2類医薬品

(販売名) イトーの葛根湯エキス錠

セルフメデイケーション

税 控除 対象

【効能】体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み



1回3錠

粒はイメージです

デザインはイメージです

※満量処方とは…

漢方処方より得られたエキスを全量配合していることを意味します。

MADE IN JAPAN

✂ <キリトリ>

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること。 漢方製剤

(販売名) イトーの葛根湯エキス錠 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) むくみ、排尿困難の症状のある人。(9) 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパチー	肝機能障害
症状	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量 次の1回量を食前又は食間に水又は白湯で服用すること。

※食間とは…食後2~3時間のことです。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才~)	3錠	1日3回
7才~14才	2錠	
7才未満	×(服用しないこと)	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分 1日量(9錠)中 葛根湯エキス2550mg(カッコン4g、マオウ3g、タイソウ3g、ケイヒ2g、シャクヤク2g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより抽出)

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロースを含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) めれた手で触れないこと。(湿気により変色する場合がある。)(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、袋開封後は早めに使用すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

お客様相談室

☎ 06-6743-3033

10:00~17:00(土日祝を除く)

101010004 5820243-2-MS228