

① ② ③ ④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧



ジキナ葛根湯内服液

第2類医薬品

△【使用上の注意】

×してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

■相対すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
①医師の治療を受けている人②妊婦又は妊娠していると思われる人③体の虚弱な人(後方の食えている人、体の弱い人)④重篤の弱い人⑤発汗傾向の著しい人⑥高齢者の今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人⑦むくみ、排尿困難のある人⑧高血圧、心臓病、腎臓病、中脳神経障害の診断を受けた人
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
症状の名称	症状
偽アルドステロン症、三オパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】本品1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス	7.1g	ショウワク	3.0g
カウコン	8.0g	カンゾウ	2.0g
マオウ	4.0g	ショウキョウ	1.0g
タイソウ	4.0g	テイビ	3.0g

上記生薬より抽出

添加剤:白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 含有

↓ここからお出ください

【効能・効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】

大人(15才以上) 1回1本
1日3回、食間によく振ってから服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)
＜注意＞

①用法・用量を厳守してください。②15才未満の小児には服用させないでください。③まれに成分の沈殿を生じる場合がありますので、服用前によく振ってから服用してください。④1回1本飲みきりですので、開封したら飲みきってください。

【保管及び取扱い上の注意】

①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)④使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社富士薬品 (OTC学術室)
電話 (048) 648-1118 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkou/gai.html>
電話 0120-149-831 (フリーダイヤル)



(01)14987524903921(93)1701

A503



かぜの初期症状に(発熱、さむけ、のどの痛み)

ジキナ葛根湯内服液

液体
かぜ薬

第2類医薬品

30mL×3本

液体かぜ薬

30mL×3本

かぜの初期症状に
(発熱、さむけ、のどの痛み)

ジキナ 葛根湯

内服液


第2類医薬品 眠くなる成分を含みません

製造販売元



株式会社富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地



使用期限
Lot.

