

感冒の初期

鼻炎 鼻かぜ 頭痛

葛根湯 内服液

30mL

第2類医薬品

かぜのひき初めに

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス …… 8300mg
 カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g
 カンゾウ 2.0g、シヨウキョウ 1.0g

より製したエキス
 添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】 体液中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1本(30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。
 〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



37A1

販売名:葛根湯内服液NY

使用期限

製造販売元 日本薬剤株式会社

製造記号

富山市東中野町一丁目1番1号
 (お問い合わせ先)電話076-424-2239
 [月~金 9:00~17:00(祝日を除く)]

ガラス:瓶 金属:キャップ

- 感冒の初期
- 頭痛
- 鼻かぜ
- 鼻炎



30mL

葛根湯

内服液

葛根湯エキス製剤

第2類医薬品

かぜのひきはじめに

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位 (感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス……………8300mg
 (カクコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ) 4.0g、ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g
 カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g

より製したエキス
 添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】 体力中等度以上のもので次の諸症：感冒の初期 (汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人 (15歳以上) 1回1本 (30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。 (用法・用量に関する注意) (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 15歳未満の小児には服用させないでください。(3) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

35A1



販売名：葛根湯内服液NY

製造販売元 日本薬剤株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号
 (お問い合わせ先) 電話076-424-2239
 [月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)]

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用期限

製造記号



満量処方

眠くなる成分を含まない

葛根湯 内服液

かぜのひき始めに

- 感冒の初期
- 鼻炎
- 鼻かぜ
- 頭痛

第2類医薬品 30mL

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名:葛根湯内服液NY

製造販売元 **日本薬剤株式会社**

富山市東中野町一丁目1番1号
(お問い合わせ先)電話076-424-2239
[月～金 9:00～17:00(祝日を除く)]

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造記号

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス …… 8300mg
[カコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g]

より製したエキス
添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】 体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1本(30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 15歳未満の小児には服用させないでください。(3) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。
【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

50A1

