

眠くなる成分を含まない

葛根湯

【内服液】

第2類医薬品

満量処方

かぜの
ひき始めに

30mL

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりませんので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

△ 相応すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ジバチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名:葛根湯内服液K

製造販売元 株式会社 廣 貫 堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口) 電話 076-424-2259

月～金 9:00～17:00(祝日を除く)

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス …… 4310mg
カクコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、シヤクヤク 3.0g
カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g

より製したエキス
添加物として、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、香料、着色料(カラメル)を含有する。

【効能・効果】 体力中等度以上のももの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1本(30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 15歳未満の小児には服用させないでください。(3) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造記号

ガラス瓶 金属:キャップ

54A1

