

●頭痛 ●感冒の初期
●鼻かぜ ●鼻炎



葛根湯内服液

30mL

第2類医薬品

かぜのひきはじめに 葛根湯エキス製剤

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、
よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

【相談すること】1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパシー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名:葛根湯内服液NX

使用期限

製造販売元 日本薬剤株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号 製造記号

(お問い合わせ先)電話076-424-2239

[月~金 9:00~17:00(祝日を除く)]

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス 4310mg
(カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ)
4.0g、ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g
カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g
より製したエキス

添加物として、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、安息香酸Na、バラベン、エタノール、カラメル、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】成人(15歳以上)
1回1本(30mL)、1日3回食間によう
く振ってから服用してください。
(用法・用量に関する注意)(1)用法・用量を厳守してください。
(2)15歳未満の小児には服用さ
せないでください。(3)本剤は1回1
本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たら
ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどか
ない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えな
いでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

4 954097717265



ガラス:瓶 金属:キャップ 01A1