

**KAIGEN**

体力中等度以上の方の

かぜの初期

頭痛・鼻かぜ

肩こり

葛根湯

カイゲンかぜ内服液

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません。

# かぜの初期の症状に カイゲンかぜ内服液

第2類医薬品

## △ 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 〈効能・効果〉

体力中等度以上のものの次の諸症：  
感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 〈用法・用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用する。

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児には服用させないこと。

### 〈成分・分量〉

90mL(1日量中)

葛根湯エキス	8.3g
カッコン	8g
マオウ	4g
タイソウ	4g
ケイヒ	3g
シャクヤク	3g
カンゾウ	2g
ショウキョウ	1g
より得た軟エキス	

添加物としてブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
  - 小児の手の届かない所に保管すること。
  - 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
  - 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- ◎本剤は生薬成分(エキス)を含有しており、まれに濁りや沈殿を生じることがありますが薬効に影響はありません。よく振ってから服用してください。

発 売 元 **カイゲンファーマ株式会社**

大阪府中央区道修町二丁目5番14号  
お客様相談室 ☎06-6202-8911  
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**  
奈良県高市郡明日香村野口317

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931