

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

葛根湯加川芎辛夷エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 本品1日量(12錠) 中

「日局」カ ッ コ ン……2.4g	「日局」カ ン ゾ ウ……1.2g
「日局」マ オ ウ……2.4g	「日局」ショウキョウ……0.6g
「日局」タ イ ソ ウ……1.8g	「日局」セ ン キ ユ ウ……1.8g
「日局」ケ イ ヒ……1.2g	「日局」シ ン イ……1.8g
「日局」シャクヤク……1.2g	

上記生薬より得た葛根湯加川芎辛夷エキス(3/5量)2400mgを含む。
なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースNa、カルメロースCa、二酸化ケイ素、トウモロコシデンプンを含む。

【効能・効果】 比較的体力があるものの次の諸症：
鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4 錠	3回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号
電 話：0120-019-776
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

*発 売 元

伸和製薬株式会社
東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号



製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地