

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

# モリチクノーン

(葛根湯加川芎辛夷エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

モリチクノーンは、葛根湯加川芎辛夷（かっこんとうかせんきゅうしんい）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、副鼻腔炎（ちくのう症）、慢性鼻炎というかかって長い病気の治療に効果があります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 効能又は効果

比較的体力があるものの次の諸症：  
鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎

#### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

#### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

#### 成分及び分量

本剤3包（1包2.5g）中に、次の生薬から抽出された葛根湯加川芎辛夷エキス4.2gが含まれています。

カッコン（葛根）……………4g	ショウキョウ（生姜）……………1g
マオウ（麻黄）……………4g	カンゾウ（甘草）……………2g
ケイヒ（桂皮）……………2g	センキュウ（川芎）……………3g
シャクヤク（芍薬）……………2g	シンイ（辛夷）……………3g
タイソウ（大棗）……………3g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

#### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
電話(06)6629-9058  
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2